

AGRO KREBS

SOLUCIONES PARA UN CAMPO MÁS PRODUCTIVO

KREBS

20-30-10

INFORMACIÓN GENERAL

KREBS 20-30-10 es un fertilizante hidrosoluble con alto contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio que beneficiarán el desarrollo y producción de las plantas. Por su contenido de fósforo, nitrógeno y potasio es ideal para las plantas ya que proporciona los elementos necesarios para su desarrollo y crecimientos de los tejidos verdes además de promover el crecimiento del sistema radicular.

BENEFICIOS

Incrementa el desarrollo vegetativo. Inductor del sistema radicular. Incrementa el amacollamiento en gramíneas. Ideal para su aplicación después del trasplante. Incrementa la resistencia natural de las plantas.

FORMAS DE APLICACIÓN

KREBS 20-30-10 se puede aplicar vía foliar o dirigido a la base del tallo en forma de drench o al sistema de riego.

CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS

FORMA	Sólido
COLOR	Verde claro
OLOR	Característico
CORROSIVIDAD	No corrosivo
INFLAMABLE	No flamable

QUÍMICAS

PH	5 - 7 a 25 °C
DENSIDAD	1 Kg
SOLUBILIDAD	Totalmente soluble
COMPATIBILIDAD	No presenta incompatibilidad

GENERALES

TIEMPO DE REENTRADA	Totalmente biodegradable
ALMACENAMIENTO	No es residual ya que es un nutriente
TOXICIDAD	Ligeramente tóxico

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 Kg

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	% (P/P)
Nitrógeno (N)	20.0%
Fósforo (P ₂ O ₅)	30.0%
Potasio (K ₂ O)	10.0%
Hierro (Fe)	280 ppm
Magnesio (MgO)	280 ppm

Ingrediente activo	% (P/P)
Manganeso (Mn)	148 ppm
Boro (B)	28 ppm
Zinc (Zn)	24 ppm
Cobre (Cu)	12 ppm
Molibdeno (Mo)	12 ppm

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ETAPA	FERTIRRIGACIÓN Kg/Ha.
ORNAMENTALES	1.0 A 2.0	Durante el desarrollo vegetativo.
LIMÓN NARANJA Y TORONJA	4.0 A 6.0	Durante el desarrollo del cultivo y al inicio de las etapas de producción.
CAÑA DE AZÚCAR, MAÍZ Y SORGO	6.0 A 10	Realizar aplicaciones a partir de 30 días de la siembra con intervalos de 20 días.

CULTIVO	ETAPA	FERTIRRIGACIÓN Kg/Ha.
MANZANO Y PERAL	1.0 A 2.0	Durante el desarrollo del cultivo y al inicio de las etapas de producción
TOMATE, CHILE, MELÓN Y SANDÍA.	2.0 A 5.0	Realizar aplicaciones cada diez días a partir del trasplante iniciando con la dosis mínima
PAPA	2.0 A 4.0	Iniciar la aplicación a los 25 días de la emergencia con intervalos de 20 días.

FECHA DE ELABORACIÓN
15 / 08 / 2025

FICHA TÉCNICA

FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES

